

บทความวิจัย

ความต้องการการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ภาวะความดันโลหิตสูง
ขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อก้าวข้ามภาวะวิกฤต*

จิตัญญา สุทธิจันทร์** ศติกันต์ กาละ*** สุรีย์พร ฤกษ์เจริญ****

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบบรรยาย (descriptive qualitative research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการพยาบาล เพื่อก้าวข้ามภาวะวิกฤตของหญิงตั้งครรภ์ภาวะความดันโลหิตสูงที่รับการรักษาในโรงพยาบาล โดยมีผู้เข้าร่วมการวิจัย จำนวน 20 ราย คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล 2 - 3 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 30 - 40 นาทีต่อครั้ง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ภาวะความดันโลหิตสูง เพื่อก้าวข้ามภาวะวิกฤต ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การดูแลด้านร่างกาย (2) การบรรเทาความปวดจากการเจ็บครรภ์คลอด (3) การพยาบาลที่ตอบสนองอารมณ์ และ (4) การรับรู้ข้อมูลภาวะสุขภาพขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล

ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า พยาบาลผดุงครรภ์ ควรให้การดูแลที่ตอบสนองความต้องการของหญิงตั้งครรภ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการให้ข้อมูลการรักษา ผลการวิจัยนี้ สามารถนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการพยาบาลสำหรับหญิงตั้งครรภ์ภาวะความดันโลหิตสูงที่รับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คำสำคัญ: หญิงตั้งครรภ์ภาวะความดันโลหิตสูง; ความต้องการการพยาบาล; ภาวะวิกฤต

* ได้รับเงินทุนอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

** นักศึกษาปริญญาโท (การผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้เขียนหลัก: kalasasikam@gmail.com

**** รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Nursing Care Needs of Hospitalized Pregnant Women with Pregnancy Induced Hypertension for Overcoming a Crisis*

Jitnattha Suttijamnong** Sasikarn Kala*** Sureeporn Kritcharoen****

Abstract

This descriptive qualitative research aimed to explore nursing care needs of hospitalized pregnant women with Pregnancy Induced Hypertension (PIH) for overcoming a crisis. Twenty participants were selected by purposive sampling based on selected criteria. Data were collected by personal in-depth interview 2-3 times, approximately 30-40 minute/time. Data were analyzed using content analysis. The findings revealed themes of nursing care needs for overcoming a crisis among hospitalized pregnant women with pregnancy induce hypertension: included 4 categories (1) Physical care (2) Painrelief due to labour pain (3) Nursing care for emotional response, and (4) Information of health status during hospitalization.

The study findings indicated nurse midwife should provide nursing care that congruent with pregnant women's needs including physical, emotional and giving information. The results of this study could be applied in recruiting and developing nursing care among hospitalized pregnant women with pregnancy-induce hypertension which will lead to improve nursing quality.

Keywords: pregnant women with pregnancy-induce hypertension; nursing care needs; crisis

* This research was supported by Graduate School, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.

** Master student of Nursing Science (Midwifery), Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.

*** Assistant Professor, Ph.D., Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand. Corresponding author: kalasasikarn@gmail.com

**** Associate Professor, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.